

Erste-Hilfe-Fragenkatalog 2025

Kategorie: **Erste-Hilfe-Meister:in**

Inhalte des 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurses:

- Grundlagen der Ersten Hilfe
- Leben retten
- Verkehrsunfall
- Erkrankungen
- Verletzungen

- 1) Durch starke Sonnenbestrahlung kann es zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Bewusstseinsstörungen, Krämpfen etc. kommen. Mit welchen Notfällen ist zu rechnen?
 - a) Sonnenallergie
 - b) Hitznotfall
 - c) Schlaganfall
 - d) Nasenbluten

- 2) Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei einem Verdacht eines Herzinfarkts zu setzen?
 - a) Notruf verständigen, Defibrillator und Verbandskasten holen lassen
 - b) Lagerung mit erhöhten Beinen
 - c) Beruhigen der Person
 - d) Falls nach 1 Stunde keine Besserung: Hausarzt aufsuchen

- 3) Durch körperliche Anstrengung in heißer oder feuchtwarmer Umgebung kann es zu einem Wärmestau und zu einer Erhöhung der Körpertemperatur kommen. Wie nennt man dieses Krankheitsbild?
 - a) Hexenschuss
 - b) Hypertonie
 - c) Hitzschlag
 - d) Hyperventilation

- 4) Bei welchem Notfall muss nicht immer sofort der Rettungsdienst verständigt werden?
 - a) Schmerzen in der Brust
 - b) Taubheitsgefühl in einer Körperhälfte
 - c) Asthmaanfall
 - d) Kollaps

- 5) Welche Aussagen treffen bei einer Vergiftung zu?
 - a) Eine Vergiftung kann einen lebensbedrohlichen Zustand hervorrufen
 - b) Vergiftungen entstehen am häufigsten bei Gefahrgutunfällen
 - c) Nur bei Aufnahme großer Mengen schädlicher Substanzen, kann von einer Vergiftung gesprochen werden
 - d) Nur feste Stoffe können Vergiftungen hervorrufen

- 6) Welche typischen Warnzeichen weisen auf einen Schlaganfall hin?
 - a) Plötzliche Schwäche oder Gefühlsstörungen einer Körperseite, besonders im Gesicht oder im Arm
 - b) Schwindel, Gangunsicherheit und Verwirrtheit
 - c) Erkrankte/r kann keinen einfachen Satz nachsprechen
 - d) Schnelle Atmung (hyperventilieren)

- 7) Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei einem Asthmaanfall zu setzen?
- a) Notruf 144 verständigen, Lagerung mit erhöhtem Oberkörper
 - b) 1450 verständigen, Lagerung mit erhöhten Beinen
 - c) Notfallmedikamente sollen eingenommen werden
 - d) Kühlung der Atemwege, z. B. mit Eiswürfeln von innen und von außen
- 8) Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind nach einer Vergiftung durchzuführen? Die Person ist nicht ansprechbar.
- a) Giftentfernung durch provoziertes Erbrechen
 - b) Überprüfung der Atmung: stabile Seitenlage oder Wiederbelebung durchführen
 - c) Bei nicht vorhandener Atmung, Verzicht auf Herzdruckmassage
 - d) Bei Tabletten in den Atemwegen: Heimlich-Manöver im Liegen durchführen
- 9) Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind beim Verdacht der Blutzuckerentgleisung bei einem Diabetiker zu setzen?
- a) Wenn die betroffene Person ansprechbar ist, soll Zuckerhaltiges zu trinken oder zu essen verabreicht werden
 - b) Lagerung: Seitenlagerung
 - c) Lagerung: mit erhöhten Beinen
 - d) Notruf absetzen
- 10) Bei welchen Notfällen wird eine Lagerung mit erhöhtem Oberkörper empfohlen?
- a) Atemnot
 - b) Herzbeschwerden
 - c) Starke Blutung
 - d) Kollaps
- 11) Bei Verdacht auf Schlaganfall wendet der/die Ersthelfer:in den FAST-Test an. F steht für Face (Gesicht), S steht für Speech (Sprache), T steht für Time (Zeit). Wofür steht das „A“ bei FAST?
- a) Apoplexie (Schlaganfall)
 - b) Arms (Arme)
 - c) Arrhythmie (Unregelmäßigkeit)
 - d) Azidose (Übersäuerung)
- 12) Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei einem Krampfanfall korrekt?
- a) Zunge festhalten, um Zungenbiss zu vermeiden
 - b) Während des Krampfes vor weiteren Verletzungen schützen (z. B. Sessel wegstellen)
 - c) Nach dem Krampfanfall, Atmung überprüfen
 - d) Wenn Erkrankte/r nach dem Krampf ansprechbar ist: Seitenlagerung empfohlen

- 13)** Was sind Erste-Hilfe-Maßnahmen bei einem Kollaps?
- a) Beine hochlagern
 - b) Warme gezuckerte Getränke verabreichen
 - c) Sollte sich der Zustand nicht rasch bessern: Rettungsdienst verständigen
 - d) Eis zum Lutschen verabreichen
- 14)** Wie lautet die Telefonnummer der Vergiftungsinformationszentrale (VIZ)?
- a) 01/43 43 43
 - b) 01/144
 - c) 01/0800 133 133
 - d) 01/406 43 43
- 15)** Welche Anzeichen können auf einen Schlaganfall deuten?
- a) Plötzliche Schwäche, Gefühlsstörung oder Lähmung einer Körperseite
 - b) Heißer Kopf
 - c) Akute Bauchschmerzen
 - d) Erkrankte/r kann keinen einfachen Satz nachsprechen
- 16)** Bei welchen Erkrankungen wird eine Lagerung mit erhöhtem Oberkörper empfohlen?
- a) Allergische Reaktion
 - b) Herzbeschwerden
 - c) Hitzenerotfall
 - d) Asthmaanfall
- 17)** Bei welchen Notfällen ist eine Seitenlage sinnvoll?
- a) Bewusstseinsstörung
 - b) Gefahr des Erbrechens
 - c) Herzbeschwerden mit Atemnot
 - d) Bei verstauchtem Knöchel
- 18)** Welche Gefahren bestehen bei einem Stich, z. B. von einer Biene?
- a) Schwellung und Rötung des Gewebes im Bereich der Einstichstelle
 - b) Gefahr einer schweren allergischen Reaktion
 - c) Schwellungen im Bereich der Atemwege
 - d) Unterzuckerung
- 19)** Welche der angeführten Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei einem Schlaganfall zu setzen?
- a) Notruf
 - b) Seitenlage empfohlen
 - c) Basismaßnahmen
 - d) Die betroffene Körperregion möglichst hochhalten

- 20)** Was können Anzeichen für einen Herzinfarkt sein?
- a) Kopfschmerzen und Ohrensausen
 - b) Schmerzen in der Brust
 - c) Engegefühl in der Brust
 - d) Angst, Atemnot
- 21)** Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei einer Vergiftung durchzuführen, wenn das Gift bekannt ist und der/die Betroffene ansprechbar ist und normal reagiert?
- a) Zuerst Notruf, dann Vergiftungsinformationszentrale kontaktieren und Anweisungen folgen
 - b) Sofort schluckweise Wasser zum Trinken geben; falls keine Besserung Notruf wählen
 - c) Zum Erbrechen bringen
 - d) Seitenlage durchführen
- 22)** Welches Prinzip wird verwendet, um bei einem psychiatrischen Notfall zu unterstützen?
- a) Das Feel-Hear-Soul Prinzip
 - b) Das Look-Listen-Link Prinzip
 - c) Das FAST-Prinzip
 - d) Das STOP-Prinzip
- 23)** Welche Telefonnummern kann man in Österreich für Beratung in psychisch belastenden Situationen wählen?
- a) 116 123
 - b) 01/406 43 43
 - c) 147
 - d) 142
- 24)** Eine Person befindet sich in einer psychisch belastenden Situation. In welchem Fall muss man sofort den Rettungsdienst verständigen?
- a) Wenn die betroffene Person 3 Tage hintereinander schlecht geschlafen hat
 - b) Wenn die betroffene Person eine geringe Verhaltensänderung zeigt
 - c) Wenn die betroffene Person nicht gut erklären kann, was sie braucht
 - d) Bei Selbst- oder Fremdgefährdung
- 25)** Die Notrufnummer der Feuerwehr lautet...
- a) 122
 - b) 133
 - c) 144
 - d) 112
- 26)** Welche Maßnahmen ergreifen Sie, wenn eine Person reglos am Bauch liegt?
- a) Sofort stabile Seitenlage durchführen
 - b) Notruf (veranlassen)
 - c) Laut ansprechen und sanft schütteln
 - d) Wenn keine Reaktion: Person umdrehen

- 27)** Welche Rettungsmöglichkeiten aus einer Gefahrenzone hat der/die Ersthelfer:in?
- a) Rautekgriff anwenden
 - b) Wegziehen in Bauch- oder Rückenlage
 - c) Rettungstuch verwenden
 - d) Seiltechniken anwenden
- 28)** Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind beim Verdacht der Unterkühlung zu setzen?
- a) Notruf, Basismaßnahmen
 - b) Warme alkoholische Getränke verabreichen, frottieren, gut zudecken
 - c) Warme gezuckerte Getränke verabreichen, Bewegung vermeiden, gut zudecken
 - d) Kopf-Tieflagerung um weiteres Absinken der Temperatur zu vermeiden
- 29)** Die Notrufnummer vom Rettungsdienst lautet...
- a) 141
 - b) 133
 - c) 144
 - d) 112
- 30)** Die Notrufnummer der Polizei lautet...
- a) 122
 - b) 133
 - c) 144
 - d) 911
- 31)** Die Nummer des Euro-Notrufs lautet...
- a) 122
 - b) 128
 - c) 144
 - d) 112
- 32)** Welche Angaben sind beim Wählen des Notrufs sinnvoll?
- a) Ob ich einen ÖNORM-Verbandskasten besitze
 - b) Genaue Adressangabe
 - c) Exakte Kilometerangabe und Fahrtrichtung auf der Autobahn
 - d) Body-Mass-Index
- 33)** Welche Nummer sollte bei einem medizinischen Notfall bevorzugt gerufen werden?
- a) 1450
 - b) 144
 - c) Völlig egal
 - d) 133

- 34)** Was soll man bei einem Notruf beachten?
- a) Den Anweisungen der Leitstelle folgen
 - b) Sich für den Notruf Zeit nehmen und auf die Fragen der Leitstelle antworten
 - c) Notruf wählen, Notfallort nennen, auflegen und Erste Hilfe leisten
 - d) Das Gespräch beendet die Leitstelle
- 35)** Welche Maßnahmen gehören zu den Basismaßnahmen?
- a) Psychische Betreuung (Look-Listen-Link)
 - b) Zur Aktivierung des Kreislaufs aufstehen
 - c) Angenehme Lagerung einnehmen (z. B. erhöhter Oberkörper bei Atemnot)
 - d) Für frische Luft sorgen und bei Notwendigkeit beengende Kleidungsstücke öffnen
- 36)** Welche Aufgaben hat der/die Ersthelfer:in?
- a) Starke Blutungen stillen
 - b) Notruf absetzen
 - c) E-Card und Ausweis kontrollieren
 - d) Retten von Verletzten aus allen Gefahrensituation
- 37)** Welches Material wird für den manuellen Druck benötigt?
- a) Saugendes Material, z. B. Wundauflage
 - b) Material zum Abbinden
 - c) Falls vorhanden: Einmalhandschuhe
 - d) Wunddesinfektion
- 38)** Wie lautet die Erste-Hilfe-Maßnahme, die mit saugendem Material mit den Fingern, dem Handballen oder der Faust mit Druck auf die stark blutende Wunde ausgeübt wird?
- a) Manueller Druck
 - b) Blutdruck
 - c) Herzdruckmassage
 - d) Druckverband
- 39)** Welche Lagerung wird bei einer starken Blutung empfohlen (z.B. Kreissägenverletzung am Unterarm)?
- a) Oberkörper-Hochlagerung
 - b) Beine-Hochlagerung
 - c) Deckenrolle unter dem Knie
 - d) Lagerung ohne Veränderung der Körperhaltung
- 40)** Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei einer starken Blutung am Unterschenkel durchzuführen?
- a) Verletzte Person hinlegen
 - b) Verletzte Person stehen lassen
 - c) Ersthelfer:in soll nur den Notruf absetzen
 - d) Manuellen Druck durchführen oder Druckverband anlegen; Beine hochlagern

- 41) Wie wird die Mund-zu-Mund-Beatmung im Rahmen der Ersten Hilfe durchgeführt?
- a) Notfallbeatmungstuch über Nase der erkrankten Person legen, Kopf nackenwärts überstrecken, Mund zuhalten und 2 Mal beatmen
 - b) Der/die Ersthelfer:in kontrolliert durch das normale Heben und Senken des Brustkorbs die Effektivität der Beatmung
 - c) Die Beatmung wird ausschließlich durch den/die Notarzt/ die Notärztin durchgeführt
 - d) Notfallbeatmungstuch über den Mund der erkrankten Person legen, Kopf nackenwärts überstrecken, Nase zuhalten und 2 Mal beatmen
- 42) Wie wird das Bewusstsein überprüft?
- a) Reglose Person massieren, bis der/die Notarzt/ Notärztin eintrifft
 - b) Durch lautes Ansprechen und sanftes Schütteln an den Schultern
 - c) Pupillenreflexe der reglosen Person mit einer (Handy-)Taschenlampe überprüfen
 - d) Schmerzreiz am Handrücken durchführen
- 43) Welche Lagerung wird bei einer reglosen Person mit normaler Atmung durchgeführt?
- a) Oberkörper-Hochlagerung
 - b) Lagerung ohne Veränderung der Körperhaltung
 - c) Deckenrolle unter dem Knie
 - d) Stabile Seitenlage
- 44) Wie soll ein/e Ersthelfer:in weiter vorgehen, wenn festgestellt wird, dass die reglose Person atmet, die Atmung aber nicht normal ist?
- a) Stabile Seitenlage durchführen
 - b) Wiederbelebung beginnen
 - c) Erkrankte Person liegen lassen und auf Rettungsdienst warten
 - d) Erkrankte Person 2-mal beatmen
- 45) Welche Schritte sind als nächstes durchzuführen, wenn der/die Verletzte auf lautes Ansprechen und sanftes Schütteln nicht reagiert?
- a) Hilferuf, Atmung kontrollieren, Atemwege freimachen
 - b) Stabile Seitenlage durchführen
 - c) Vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich
 - d) Hilferuf, Atemwege freimachen, Atmung kontrollieren
- 46) Wie wird die stabile Seitenlage korrekt durchgeführt?
- a) Arm zur Seite legen, gegenüberliegendes Knie hochziehen, Handgelenk aufs Knie legen und herdrehen
 - b) Arm nach oben legen, gegenüberliegendes Knie hochziehen und herdrehen
 - c) Arm zur Seite legen, gegenüberliegendes Knie hochziehen, Ellbogen aufs Knie und herdrehen
 - d) Beide Arme zur Seite legen, gegenüberliegendes Knie hochziehen und herdrehen

- 47) Welche Erste-Hilfe-Ausrüstung kann eine/n Ersthelfer:in vor Infektionen schützen?
- a) Beatmungstuch
 - b) Einmalhandschuhe
 - c) Taschentuch
 - d) Rettungsdecke
- 48) Wie versorgt man eine/n Verletzte/n mit einer stark blutenden Wunde an einer Extremität?
- a) Nur den Notruf abzusetzen – der Rettungsdienst kümmert sich um die Wunde
 - b) Pflasterverband anbringen
 - c) Manuellen Druck auf die Wunde ausüben oder Druckverband anlegen
 - d) Notruf absetzen, verletzten Körperteil hochhalten
- 49) Wie gehen Sie bei der Wiederbelebung einer erwachsenen Person als trainierte/r Ersthelfer:in vor?
- a) 3 Herzdruckmassagen / 1 Beatmung
 - b) 10 Herzdruckmassagen / 5 Beatmungen
 - c) 15 Herzdruckmassagen / 2 Beatmungen
 - d) 30 Herzdruckmassagen / 2 Beatmungen
- 50) Wann spricht man von einer reglosen Person?
- a) Person reagiert nur auf Schmerzreize wie Zwicken in die Wangen
 - b) Person ist verwirrt und kann sich an nichts erinnern
 - c) Keine Reaktion auf lautes Ansprechen und sanftes Schütteln
 - d) Bewusstseinslage kann durch den/die Ersthelfer:in nicht überprüft werden
- 51) Was bedeutet die Abkürzung "AED"?
- a) Automatisierte – Energiegeladene – Darreichung
 - b) Automatisierte - Erdgas - Dauerfunktion
 - c) Automatisierter - Externer - Defibrillator
 - d) Automatisierter - Elektrischer - Druck
- 52) Welche Aussagen treffen bei einer reglosen Person zu?
- a) In Rückenlage besteht Lebensgefahr durch Ersticken
 - b) Stabile Seitenlage ist die optimale Lagerung, wenn normale Atmung feststellbar ist
 - c) In Rückenlage besteht keine Lebensgefahr
 - d) Falls keine normale Atmung feststellbar, mit Wiederbelebung starten
- 53) In welchem Alter darf von Ersthelfer:innen ein Defibrillator verwendet werden?
- a) Ab dem 1. Lebensjahr
 - b) Ab dem 8. Lebensjahr
 - c) Ab Beginn der Pubertät
 - d) In jedem Alter

- 54) Was bedeutet "defibrillieren"?
- a) elektrisieren
 - b) früh erkennen
 - c) entflimmern
 - d) reanimieren
- 55) Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind durchzuführen, sobald der/die Erkrankte in die stabile Seitenlage gebracht wurde?
- a) Elektroden des Defibrillators am Brustkorb anbringen
 - b) Basismaßnahmen durchführen
 - c) Spätestens jetzt Notruf wählen, regelmäßige Atemkontrollen
 - d) Sofort mit Herzdruckmassage und Beatmung beginnen
- 56) Welche Aussagen treffen bezüglich Defibrillation zu?
- a) Die Defibrillation darf in jedem Alter angewendet werden
 - b) Die Defibrillation darf nur von Sanitäter:innen angewendet werden
 - c) Die Defibrillation darf nur von einem Arzt/ einer Ärztin angewendet werden
 - d) Die rechtliche Situation besagt, dass die Defibrillation in einer Notsituation unbedenklich ist
- 57) Welche Maßnahmen führen Sie bei einer reglosen Person mit normaler Atmung durch?
- a) Stabile Seitenlage zum Freihalten der Atemwege
 - b) Auf dem Rücken liegend und mit überstrecktem Kopf lagern
 - c) Flache Rückenlagerung und Beine hochlagern
 - d) Erhöhter Oberkörper für die Entlastung des Herzens
- 58) Was soll ein/e Ersthelfer:in bei der Defibrillation beachten?
- a) Elektroden fest auf den Brustkorb kleben
 - b) Während Schockabgabe die erkrankte Person nicht berühren
 - c) Nassen Brustkorb vorher abtrocknen
 - d) Während Schockabgabe die zu defibrillierende Person berühren (Qualitätskontrolle)
- 59) Bei welcher Verletzung ist der manuelle Druck zur Blutstillung geeignet?
- a) Starke Blutung am Unterschenkel
 - b) Schürfwunde
 - c) Magenblutung
 - d) Bluterguss
- 60) Welche Handgriffe führen Sie vor einer Mund-zu-Mund-Beatmung durch?
- a) Kinn hochziehen
 - b) Nase zuhalten
 - c) Arm im rechten Winkel zur Seite legen
 - d) Stabile Seitenlage

- 61) Wenn ein/e Erwachsene/r nicht ansprechbar ist und nicht normal atmet, rufen Sie den Rettungsdienst und...
- a) Führen die stabile Seitenlage durch
 - b) Führen sofort Beatmungen durch
 - c) Beginnen sofort mit der Herzdruckmassage
 - d) Versuchen eine Lagerung mit erhöhten Beinen
- 62) Aus welchen Schritten besteht der Notfallcheck?
- a) Atemwege freimachen und Atmung kontrollieren
 - b) Notfallcheck dürfen nur Sanitäter:innen oder Notarzt/Notärztinnen durchführen
 - c) Laut ansprechen und sanft schütteln, Hilferuf
 - d) Atemkontrolle nicht länger als 10 Sekunden durchführen
- 63) Welche Aussagen zur Herzdruckmassage im Rahmen der Ersten Hilfe sind korrekt?
- a) Beide Arme des Helfers durchstrecken
 - b) Störende Kleidung der erkrankten Person entfernen (dicke Mäntel etc.)
 - c) Erkrankte Person auf eine harte Unterlage legen
 - d) Auf die Mitte des Brustkorbes schnell und kräftig drücken
- 64) Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand durchzuführen?
- a) Zweimalige Beatmung und danach den Notruf absetzen
 - b) Einen Defibrillator und Verbandkasten holen lassen
 - c) Notruf absetzen und Beatmungen durchführen
 - d) Notruf absetzen und sofort Herzdruckmassagen und Beatmungen (30:2) durchführen
- 65) Welche Vorgehensweise ist bei der Anwendung eines Defibrillators korrekt?
- a) Defibrillator einschalten und den Anweisungen des Geräts folgen
 - b) Während Schockabgabe Herzdruckmassage durchführen
 - c) Elektroden aufkleben und dann erst Defibrillator einschalten
 - d) Solange eine Beatmung durchgeführt wird: keine Elektroden aufkleben
- 66) Was versteht man unter einer starken Blutung?
- a) Wenn aus einer Wunde innerhalb kurzer Zeit eine große Blutmenge verloren geht
 - b) Wenn ein paar Tropfen Blut langsam aus der Wunde tropfen
 - c) Wenn das Blut aus der Wunde spritzt
 - d) Wenn das Blut im Schwall austritt
- 67) Welche Maßnahme ist von/vom Ersthelfer:in zu setzen, wenn es bei einer starken Blutung durch den Druckverband durchblutet?
- a) Manuellen Druck auf dem Druckverband ausüben
 - b) Weiterbluten lassen
 - c) Bestehenden Druckverband wieder heruntergeben und mit verwendetem Material wieder neuen Druckverband anlegen
 - d) Abbindung vornehmen

- 68) Was sollte der/die Ersthelfer:in bei der Blutstillung vermeiden?
- a) Verwendung einer keimfreien Wundauflage
 - b) Durchführung der Basismaßnahmen
 - c) Wenn möglich: direkten Kontakt mit Blut
 - d) Wenn möglich: Verwendung von Mullbindenverbänden
- 69) Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind beim Anlegen eines Druckverbandes durchzuführen?
- a) E-Card und Ausweis kontrollieren
 - b) Keimfreie Wundauflage fest auf die Wunde drücken
 - c) Druckkörper durch festes Umwickeln mit der Mullbinde einwickeln
 - d) Verletzte/r soll anfangs selbst fest auf die Wunde drücken
- 70) Welche Erste-Hilfe-Maßnahmen sind beim Verschlucken (schwere Verlegung der Atemwege) durchzuführen?
- a) Oberkörper nach vorne beugen, Brustkorb stützen und bis zu 5x Heimlich-Manöver durchführen. Falls keine Besserung: Bis zu 5 Schläge zwischen die Schulterblätter durchführen usw.
 - b) Oberkörper nach vorne beugen, Brustkorb stützen und bis zu 5x fest zwischen die Schulterblätter schlagen. Falls keine Besserung: Heimlich-Handgriff bis zu 5x durchführen usw.
 - c) Dem/der Betroffenen warme Getränke zum Auflösen des Fremdkörpers verabreichen
 - d) Falls der/die Betroffene reglos wird, entspricht dies einem Atem-Kreislauf-Stillstand und es ist sofort mit der Wiederbelebung zu beginnen
- 71) Wie wird die Maßnahme bei einer schweren Verlegung der Atemwege bei Säuglingen bezeichnet, nachdem die Schläge zwischen die Schulterblätter durchgeführt wurden?
- a) Heimlich-Handgriff
 - b) Rautek-Griff
 - c) Kompressionsverband
 - d) Brustkorbkompression
- 72) Womit sichert ein/e Ersthelfer:in bei einem Verkehrsunfall ab?
- a) Warndreieck
 - b) Feuerlöscher
 - c) Warnblinkanlage
 - d) Blaulicht
- 73) Wann muss ein Warndreieck auf Freilandstraßen aufgestellt werden?
- a) Bei Nebel muss kein Warndreieck aufgestellt werden
 - b) Wenn das Fahrzeug auf einer unübersichtlichen Straßenstelle zum Stillstand gekommen ist
 - c) Wenn das Fahrzeug bei schlechter Sicht zum Stillstand gekommen ist
 - d) Wenn noch kein Notruf abgesetzt wurde

- 74)** Warum muss der Helm abgenommen werden, wenn der/die Verletzte nicht reagiert?
- a) Aus versicherungstechnischen Gründen
 - b) Gefahr einer Wirbelsäulenverletzung
 - c) Um die Atmung zu erleichtern
 - d) Um die Atmung zu überprüfen
- 75)** Welche Schritte gehören zum Rautekgriff beim Retten aus einem PKW?
- a) Oberkörper stützen, Gurt entfernen
 - b) Schlüssel abziehen und Handbremse ziehen
 - c) Verletzte/n auf den eigenen Oberschenkel ziehen bzw. setzen
 - d) Deaktivierung der Airbags, falls diese nicht ausgelöst haben
- 76)** Wie verhalten Sie sich bei einem Verkehrsunfall mit einer reglosen Person im Fahrzeug?
- a) Fremdschutz geht vor Selbstschutz
 - b) Falls möglich: Rettung aus dem Fahrzeug
 - c) Selbstschutz beachten
 - d) In ausreichendem Abstand absichern
- 77)** Die GAMS-Regel erläutert dem Ersthelfer richtiges Verhalten bei Gefahr. „G“ steht für Gefahr erkennen, „A“ für Abstand halten, „S“ steht für Spezialkräfte anfordern und „M“ für?
- a) Menschenrettung durchführen (falls gefahrlos möglich)
 - b) Medizinisches Personal herbeiziehen (Rettungsdienst)
 - c) Material überprüfen (Verbandskasten)
 - d) Mund öffnen (stabile Seitenlage)
- 78)** Welchen Grundsatz soll jede/r Ersthelfer:in in einer Gefahrenzone beachten?
- a) Es gibt nie ein Gefahrenpotential bei der Leistung von Erster Hilfe
 - b) Selbstschutz geht vor Fremdschutz
 - c) Fremdschutz geht vor Eigenschutz
 - d) Dem/der Mutigen gehört die Welt
- 79)** Wann und wozu schalten Sie die Warnblinkanlage ein?
- a) Vor dem Anlegen der Warnweste
 - b) Nach dem Anlegen der Warnweste
 - c) Wenn Gefahr vom eigenen Fahrzeug ausgeht
 - d) Wenn Sie vor Gefahren warnen wollen
- 80)** Etwa wieviel Prozent der Unfälle passieren zu Hause/in der Freizeit/beim Sport?
- a) 10
 - b) 50
 - c) 75
 - d) 95

- 81)** Wie kann ich bei einer Knochen-/ Gelenkverletzung Erste Hilfe leisten?
- a) Bei einer Verrenkung der Schulter ist diese vorsichtig von Ersthelfer:innen einzurenken
 - b) Bei einem Armbruch kann ein Dreieckstuch angelegt werden
 - c) Bei einer Verstauchung des Fußes wird mit heißen Umschlägen therapiert
 - d) Generell gilt: Ruhigstellen – kühlen – Beengendes entfernen/lockern
- 82)** Welche Maßnahmen sind nach einer Bissverletzung (Haustier) zu setzen?
- a) Wunde mit Wasser spülen, verbinden und sofort ärztlich versorgen lassen
 - b) Wunde mit Händedesinfektion desinfizieren, verbinden
 - c) Wunde verbinden und nach 2 Tagen ärztlich begutachten lassen
 - d) Wunde mit erträglich heißem Seifenwasser spülen und verbinden
- 83)** Welche der angeführten Erste-Hilfe-Maßnahmen sind bei Nasenbluten zu setzen?
- a) Verletzte/n hinsetzen und den Kopf nach vorne beugen lassen, Nasenflügel zudrücken
 - b) Verletzte/n hinsetzen und den Kopf nackenwärts beugen lassen
 - c) Kaltes Tuch in den Nacken legen
 - d) Zuckerhaltige Getränke verabreichen
- 84)** Welche Aussagen treffen bei Verbrennungen zu?
- a) 10 Minuten mit Wasser spülen
 - b) Bis zu 10 Minuten mit handwarmem Wasser spülen
 - c) Ausgiebig mit Wasser spülen (keine Temperatur- und Zeitvorgabe)
 - d) Verbrennungen werden nicht gespült, sondern nur locker und steril verbunden
- 85)** Wie sind Augenverätzungen zu versorgen?
- a) Sofort Augenarzt kontaktieren
 - b) 10 Minuten mit handwarmem Wasser spülen und Notruf wählen
 - c) Sofort und ausgiebig mit Wasser spülen und Notruf wählen
 - d) Nach dem Spülen des verätzten Auges über beide Augen einen Verband anlegen
- 86)** Welche Lagerung wird bei einer Kopfverletzung empfohlen?
- a) Stabile Seitenlage
 - b) Bein-Hochlagerung
 - c) Oberkörper-Hochlagerung
 - d) Keine spezielle Lagerung
- 87)** Was machen Sie, wenn ein/e verletzte/r Motorradfahrer:in außerhalb einer Gefahrenzone auf dem Bauch liegt und nicht reagiert?
- a) Umdrehen und Helm abnehmen
 - b) Umdrehen und Helm aufgesetzt lassen
 - c) Helm in Bauchlage abnehmen
 - d) Stabile Seitenlage mit Helm durchführen

- 88)** Was können Hinweise auf eine Knochen-/ Gelenkverletzung sein?
- a) Bewegungsunfähigkeit oder Bewegungseinschränkung
 - b) Schmerzen, Schwellung
 - c) Abnorme Stellung
 - d) Große Beweglichkeit
- 89)** Wann kann es bei einer Knochen-/ Gelenkverletzung sinnvoll sein, den Notruf zu wählen?
- a) In der Nacht, damit ich Angehörige/Nachbarn nicht bitten muss, mich ins Krankenhaus zu bringen
 - b) Wenn mir öffentliche Verkehrsmittel zu teuer sind
 - c) Bei starken Schmerzen
 - d) Bei einer Verletzung der Hüfte oder des Oberarms